

КАЛЬЦЕМИН®



Область применения



Особенности действия и данные клинических исследований



Схема применения

Восполнение дефицита кальция и микроэлементов для укрепления костной ткани, ногтей, волос.

Профилактика недостаточности кальция во время беременности, профилактика и лечение симфизииопатии с 20-й недели беременности и до родов.

Профилактика дефицита кальция у детей от 5 до 12 лет.

Полноценное восполнение кальция и минералов. Специальные минералы способствуют обновлению собственного коллагенового матрикса, который помогает улучшать структуру костей, волос и ногтей¹.

Содержит карбонат и цитрат кальция с высоким усвоением в комплексе со специальными минералами и витамином D. Доказано обеспечивает профилактику и лечение симфизита у беременных².

Обеспечивает полноценное восполнение кальция и минералов при повышенной потребности в них.

По 1 таблетке
2 р/день
2-3 месяца*

По 1 таблетке
1 р/день
2-3 месяца

КАЛЬЦЕМИН®

АДВАНС



Область применения



Особенности действия и данные клинических исследований



Схема применения

Профилактика и терапия остеопороза различного генеза: возрастного, идиопатического, у женщин в период менопаузы (естественной и хирургической), у лиц, длительно принимающих глюкокортикостероиды и иммунодепрессанты.

Консолидация остеопоротических и травматических переломов в составе комплексной терапии

Во время беременности, при низком потреблении кальция для профилактики преэклампсии с периода зачатия и до родов.

В период грудного вскармливания.

Содержит карбонат и цитрат кальция с высоким усвоением в комплексе со специальными минералами и витамином D. Удерживает кальций и способствует сохранению костной массы. Доказано способствует синтезу коллагена и увеличению минеральной плотности кости до 3,55%^{3,4}.

Удерживает кальций, способствует синтезу коллагенового матрикса костной ткани. Доказано ускоряет консолидацию травматических переломов на 25%⁵.

В соответствии с клиническими рекомендациями, применение 1 г кальция в сутки снижает риск развития преэклампсии⁶.

Восполнение кальция и минералов при повышенной потребности в них.

По 1 таблетке:
профилактика –
2 р/день;
терапия – 2-3 р/день
2-3 месяца*

По 1 таблетке
1-3 р/день 3 месяца*

По 1 таблетке
1-2 р/день
на протяжении
всего периода
беременности*.⁶

По 1 таблетке
1-2 р/день

* Более продолжительный курс – после консультации с врачом.

1. Дыдыкина И. С. Вклад микроэлементов (меди, марганца, цинка, бора) в здоровье кости: вопросы профилактики и лечения остеопении и остеопороза. Эффективная фармакотерапия. 2013; 38.

2. Мозговая Е. В., Кучеренко М. А., Гззян А. М., Дедуль А. Г. Оценка влияния препарата кальцецин на клинические симптомы и уровень маркеров костной резорбции при симфизииопатиях у женщин в III триместре беременности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2009; (4): 251-258.

3. В группе АТХ: А12АХ (Препараты кальция в комбинации с другими препаратами), по данным АО Группы ДСМ (DSM Group) сентябрь 2024 г.

4. Лила А. М., Мазуров В. И. Роль Кальцецин® Адванс в профилактике постменопаузального остеопороза (результаты 12-месячного клинического исследования). Русский медицинский журнал. 2007; 15: 26.

5. Гаркуша М. А. Опыт применения препарата Кальцецин® Адванс у людей различного возраста и пола в лечении остеопоротических переломов дистального отдела предплечья. Проблемы остеологии. 2006; 9(2-3).

6. Клинические рекомендации «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде» – 2024, МЗ РФ. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/637_2 (дата обращения: сентябрь 2024).



КАЛЬЦЕМИН®

Комбинированный препарат, который содержит карбонат и цитрат кальция легкого усвоения в комплексе со специальными минералами и витамином D₃¹.

Ca

250 мг
(карбонат + цитрат)

D₃

50 ME

Mn

0,5 мг

Zn

2 мг

Cu

0,5 мг

B

0,05 мг

КАЛЬЦЕМИН®

АДВАНС

Единственный² препарат карбоната и цитрата кальция, усиленный 5 специальными минералами и витамином D₃ для синтеза коллагенового матрикса, который способствует лучшему удержанию кальция в костной ткани и сохранению костной массы.

Ca

500 мг
(карбонат + цитрат)

D₃

200 ME

Mn

1,8 мг

Mg

40 мг

Cu

1 мг

Zn

7,5 мг

B

0,25 мг



1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Кальцецин®, регистрационный номер: П N015890/01.

2. В группе АТХ: A12AX (Препараты кальция в комбинации с другими препаратами), по данным АО Группы ДСМ (DSM Group) сентябрь 2024.

«АО Байер», 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул, д. 18, стр. 2. Телефон: +7 (495) 231-12-00.

№ СН-20241128-85.

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ