

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Релиф® Адванс

Регистрационный номер: П N014500/01

Торговое название

Релиф® Адванс

Международное непатентованное название

Бензокаин.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Состав

1 суппозиторий содержит

Действующее вещество: бензокаин 206 мг.

Вспомогательные вещества: какао масло 1448 мг, крахмал кукурузный 340 мг, метилпарагидроксибензоат 2 мг, пропилпарагидроксибензоат 4 мг.

Описание

Непрозрачные суппозитории от бледно-белого до светло-желтого цвета в форме торпеды.

Фармакотерапевтическая группа

Местноанестезирующее средство.

Код АТХ: D04AB04

Фармакологические свойства

Бензокаин – местный анестетик, не оказывает резорбтивного действия.

Масло какао оказывает смягчающее действие.

Показания к применению

Местное обезболивающее средство при геморрое, трещинах заднего прохода, после проктологических операций, при проведении диагностических манипуляций.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тромбозэмболическая болезнь, гранулоцитопения.

Способ применения и дозы

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.

Взрослые и дети старше 12 лет: вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз в сутки (утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника) в течение 7 дней. При

необходимости по рекомендации врача курс лечения можно продлить до 3 недель.

Дети до 12 лет: применять по указанию врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих бензокаин, в различных условиях. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата.

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергические реакции.

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

Метгемоглобинемия.

Общие расстройства и нарушения в месте введения

Эритема, местное раздражение, отек, боль, сыпь в месте применения.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Аллергический дерматит.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки могут быть связаны с фармакологическими эффектами бензокаина. Его системная абсорбция при передозировке может проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением, в тяжелых случаях – судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию, которая проявляется дыхательными расстройствами и цианозом. Внутривенное введение метиленового синего является специфическим средством в лечении этого состояния.

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат детям до 12 лет без согласования с врачом. При случайном употреблении внутрь следует немедленно обратиться за квалифицированной помощью.

При обильных кровавистых выделениях из заднего прохода или при сохранении

болезненных симптомов более 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Имеются сообщения о том, что продукты, содержащие бензокаин, могут вызывать метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз кожи, губ и ногтей, головная боль, головокружение, одышка (затруднение дыхания), слабость, тахикардия, которые наблюдаются во время лечения, могут свидетельствовать о потенциально опасной для жизни метгемоглобинемии, которая требует немедленной медицинской помощи.

В целях минимизации системных побочных эффектов не превышать рекомендуемую суточную дозу, если иное не предписано врачом.

Не рекомендуется применять препарат на поврежденной коже, так как это может повысить системную абсорбцию.

Применение при беременности и в период лактации

В период беременности и лактации препарат применять после консультации с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 206 мг. По 5 или 6 суппозиториям помещают в блистер из двухслойной непрозрачной пленки из поливинилхлорида и полиэтилена (ПВХ/ПЭ). 2 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Владелец регистрационного удостоверения: АО «БАЙЕР», Россия

Произведено: Институт де Ангели С.р.Л., 50066 Регелло (Флоренция), Лок. Прулли, 103/С, Италия

Или

АО «Нижфарм», 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7, Россия

Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «БАЙЕР», Россия

107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2

Тел.: +7 (495) 231-12-00

www.bayer.ru

Данная версия инструкции действует с 24.05.2022