


Согласно исследованию **применение РелиБаланс®** в дополнение к консервативному лечению пациентов с острым и хроническим геморроем **позволило достичь облегчения симптомов быстрее и активнее**

Боль

Облегчение болевого синдрома наблюдалось в 2 раза чаще к 7 дню применения по сравнению с контрольной группой



Кровотечение

Купирование кровотечения у 39% пациентов к 7 дню против 25% в контрольной группе



Нормализация дефекации

у 97% к 21 дню



Добавление РелиБаланс® к стандартной схеме лечения геморроя способно **положительно влиять на облегчение симптомов**, а также **снижать риск развития осложнений благодаря** нормализации работы ЖКТ и венотонизирующему эффекту¹

Распределение пациентов в зависимости от характера и стадии заболевания (n=126), n (%):

		Исследуемая группа (n=66)	Контрольная группа (n=60)	p-value
Острый геморрой		6 (9,09%)	6 (10%)	0,46
Хронический геморрой	I ст.	23 (34,85%)	21 (35%)	0,82
	II ст.	31 (46,97%)	27 (45%)	0,19
	III ст.	6 (9,09%)	6 (10%)	0,26

Все пациенты получали консервативное лечение топическими препаратами в зависимости от клинических проявлений геморроя в течение 21 дня

Пациенты исследуемой группы в дополнение к консервативной терапии получали РелиБаланс® по 1 саше с сутки

Узнать больше

Эффекты обусловлены комплексным действием компонентов, которые способствуют:

○ Буферизованный диосмин Микросмин Плюс (μSMIN® Plus) — снижению риска венозного застоя в геморроидальных венах

○ Инулин — нормализации стула и микрофлоры кишечника

○ Рутин — восстановлению тонуса и уменьшению воспаления в стенках сосудов

1. Ильканич А. Я., Воронин Ю. С., Айсанов А. А., Матвеева А. С., Зубаилов К. З., Коломыц Р. А. Опыт применения биологически активной добавки при проведении консервативного лечения больных с острым и хроническим геморроем в амбулаторных условиях. РМЖ. 2024;11:32-36. DOI: 10.32364/2225-2282-2024-11-6.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

© 2015–2024 АО «БАЙЕР»
Все права защищены

БАЙЕР