



ПРЕПАРАТЫ ЛИНЕЙКИ БЕПАНТЕН ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ АПТЕЧКИ

Безрецептурные лекарственные средства

Бепантен Мазь


Мазь 30/50/100 г



Профилактика и лечение
опрелостей

Бепантен Крем


Крем 30/50/100 г



Лечение и профилактика
сухости кожи

Бепантен Плюс

Крем 30/100 г



Лечение и обработка ран,
ссадин, ожогов

Оригинальные препараты декспантенола

Декспантенол 50 мг
Ланолин в концентрации 25%

Профилактика и лечение

- Опрелостей у малыша
- Трещин сосков у мамы
- Для сумки в роддом
- При запросе на средства для детей (соски, бутылочки, пеленки)

для МАЛЫША:

Выдавить небольшое кол-во мази (размером с горошину), растереть в ладонях, нанести легкими движениями на кожу ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ ПОДГУЗНИКА.

для МАМЫ:

Нанести на область сосков после каждого кормления. Смыть водой перед следующим кормлением.

Декспантенол 50 мг и эмолентные компоненты, усиливающие его действие

- При запросе на SOS-средства при дерматитах
- Для ухода за сухой и атопичной кожей
- При запросе на ГКС (например, Тридерм, Целестодерм) для достижения более выраженного эффекта лечения дерматита и уменьшения сухости

Нанести крем тонким слоем 1–2 раза в день на пораженную поверхность и слегка втереть.

Декспантенол и хлоргексидин для оказания дезинфицирующего и заживляющего действия

- Покупатель, собирающий аптечку в отпуск
- Для семейной аптечки при любых повреждениях кожи
- Для обработки и заживления ссадин, порезов, пролежней

Нанести крем тонким слоем один или несколько раз в день на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок.

Основные
компоненты*

Портрет
покупателя

Способ
применения

*Полный состав указан в инструкции.

для СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СН-2024/0826-84

Бепантен® Мазь для наружного применения.

МНН или группировочное название: декспантенол.

Показания к применению: Лечение и уход за кожей ребенка (при опрелостях и пеленочном дерматите) и кормящей матери (уход за молочной железой в период лактации (лечение сухости сосков и болезненных трещин). Профилактика и лечение сухости кожи при нарушении целостности ее покровов. Активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, легких ожогах, ссадинах, кожных раздражениях, хронических язвах, пролежнях, трещинах и при пересадке кожи.

Способ применения и дозы: При уходе за грудными детьми мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки). При уходе за молочной железой мазь наносят на область соска после каждого кормления, перед кормлением мазь необходимо смыть. Поврежденный или воспаленный участок кожи – мазь наносят 1–2 раза в день (при необходимости чаще).

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочное действие: аллергические реакции (крапивница, зуд).

Фертильность, беременность и лактация: можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-№(006033)-(PF-RU) от 27.06.2024. Полную информацию смотрите в ОХЛП – Общая характеристика лекарственного препарата Бепантен доступна на информационном портале Евразийского экономического союза <https://eec.eaeunion.org/>.

Держатель РУ: АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Бепантен®. Крем для наружного применения.

МНН или группировочное название: декспантенол.

Показания к применению: при нарушении целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т. ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.). Профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как следствие дерматитов различного генеза, а также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки). Лечение и уход за кожей ребенка (при опрелостях и «пеленочном» дерматите) и кормящей матери (уход за молочной железой в период лактации (трещины и покраснения сосков молочной железы)).

Режим дозирования и способ применения: Профилактика и лечение сухости кожи: крем наносят тонким слоем 1–2 раза в день (при необходимости чаще) и слегка втирают. Пораженный участок кожи: наносят 1–2 раза в день (при необходимости чаще). Уход за молочными железами: наносят на поверхность сосков после каждого кормления. При уходе за детьми: наносят при каждой смене подгузника (пеленки). Способ применения: наружно.

Противопоказания: гиперчувствительность к декспантенолу или любому из вспомогательных веществ.

Нежелательные реакции: аллергические реакции возможны в очень редких случаях.

Фертильность, беременность и лактация: можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-№(006118)-(PF-RU), дата перерегистрации 03.07.2024. Полную информацию смотрите в Общей характеристике лекарственного препарата Бепантен на портале Евразийского экономического союза <https://eec.eaeunion.org/>.

Держатель регистрационного удостоверения на территории России/ Организация, принимающая претензии потребителей: АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.

Бепантен® Плюс. Крем для наружного применения.

МНН или группировочное название: декспантенол + хлоргексидин.

Показания к применению: обработка и лечение небольших ран с угрозой инфицирования, таких как ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги; инфицированных поверхностных поражений кожи; трещин сосков в период грудного вскармливания. При хронических ранах, например, трофических язвах голени, пролежнях, а также при операционных ранах.

Режим дозирования и способ применения: наносят тонким слоем один или несколько раз в день на предварительно очищенную раневую поверхность или на воспаленные участки кожи. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок. Способ применения: наружно.

Противопоказания: гиперчувствительность к декспантенолу, хлоргексидину или любому из вспомогательных веществ. Бепантен Плюс не следует наносить на поврежденную барabanную перепонку, в случае тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран.

Фертильность, беременность и лактация: можно использовать во время беременности и в период грудного вскармливания. Следует избегать его применения на больших поверхностях кожи. При использовании для обработки трещин сосков во время лактации препарат должен быть смыт перед кормлением грудью.

Нежелательные реакции: возможны гиперчувствительность, анафилактическая реакция, анафилактический шок (частота возникновения неизвестна), сообщалось об аллергических кожных реакциях, таких как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и волдыри (частота возникновения неизвестна).

Особые указания: если препарат используется для обработки трещин сосков во время лактации, он должен быть смыт перед кормлением грудью. Следует избегать попадания препарата в глаза, уши и на слизистые оболочки. Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также кусаные и колотые раны требуют врачебного вмешательства (опасность столбняка). Бепантен® Плюс не следует использовать для лечения кожных раздражений, не склонных к инфицированию (например, солнечные ожоги). Частое нанесение на один и тот же участок кожи может привести к появлению раздражения.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Хлоргексидин несовместим с мылом и другими анионными соединениями. Не следует применять препарат одновременно с другими антисептиками.

Номер регистрационного удостоверения: ЛП-№(006270)-(PF-RU) от 18.07.2024. Полную информацию смотрите в Общей характеристике лекарственного препарата на портале Евразийского экономического союза <https://eec.eaeunion.org/>.

Держатель регистрационного удостоверения на территории России: АО «БАЙЕР», Россия, 107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.