## Иберогаст<sup>®</sup>



## 9 ТРАВ. 6 СИМПТОМОВ. 1 РЕШЕНИЕ

ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА















Спазм

Метеоризм

Тяжесть

Запор

Диарея

Тошнота




СПОСОБЕН ОБЛЕГЧАТЬ СИМПТОМЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ\*

\*Vinson BR, Holtmann G. Onset of action ans efficiency of STW5 in the clinical setting in patients with functional dyspepsia and irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2013; Vol 144, Issue 5, Supp 1:682 (Mo 1881)

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ ЖКТ







Эффективность подтверждена в ряде клинических исследований 1,2,3, в которых принимали участие более 800 пациентов



Действенность препарата оценили уже более 100 миллионов людей по всему миру



Быстрое действие<sup>4</sup>: может применяться как средство скорой помощи при боли в желудке

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:\*

- 20 капель
- 3 раза в день до или во время еды
- Для взрослых и детей с 12 лет
- Длительность терапии составляет 4 недели.
- Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

CH-20250217-4

<sup>\*</sup>Инструкция по медицинскому применению препарата Иберогаст® (ЛП-000094) от 30.03.202225.

<sup>1.</sup> Klein-Galczinsky et al. Anwendungsbeobachtung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Iberogast® in der Therapie des Colon irritabile. Phytotherapie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend, 1999.

<sup>2.</sup> Raedsch et al. Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des Phytopharmakons STW 5 versus Metoclopramid oral bei funktioneller Dyspepsie unter Praxisbedinungen. Z Gastroenterol, 2007.

<sup>3.</sup> Sassin et al. Efficacy and tolerability of the herbal preparation Iberogast\* in the therapy of functional dyspepsia. Phytomedicine, 2000.

<sup>4.</sup> Raedsch R, Vinson B, Ottillinger B, Holtmann G. Early onset of efficacy in patients with functional and motility-related gastrointestinal disorders: A noninterventional study with Iberogast. Wien Med Wochenschr. 2017 Jul 25.