

РЕЛИФ® – ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ

Хронический геморрой

При отеке
и кровоточивости⁴



Фенилэфрин

Суппозитории №10
Мазь 28,4г

При болевом
синдроме



Бензокаин

Суппозитории №10
Мазь 25г

При зуде
и воспалении



Гидрокортизона ацетат
+ цинка сульфат

Суппозитории №10

Острый геморрой

Быстрый анестетик² и сильный
стероид³ для облегчения
симптомов геморроя
в послеоперационном периоде



Лидокаин
+ Флуокортолона пивалат

Суппозитории №10
Крем 10г

Анальная трещина

Уникальная комбинация
нифедипина и лидокаина
для лечения анальной
трещины.



Лидокаин + Нифедипин

Гель 20г

Профилактика геморроя и комплексная терапия геморроя



Микросмин Плюс (µSMIN® Plus) - буферизованная форма диосмина
Инулин
Рутин
Суспензия по 10мл №20

Эффекты обусловлены комплексным действием компонентов, которые способствуют:

- снижению риска венозного застоя в геморроидальных венах
- нормализации стула (его регулярности и консистенции) и микрофлоры кишечника
- восстановлению тонуса и уменьшению воспаления в стенках сосудов

РелиБаланс® БАД Не является лекарственным средством

2. Covino BG. Pharmacology of local anaesthetic agents. Br J Anaesth. 1986 Jul;58(7):701-16

3. Флуокортолона пивалат относится к классу сильных топических ГКС, согласно классификации Миллера-Монро (1980), с изменениями и дополнениями. Tauber U. Dermatocorticosteroids - structure, activity, pharmacokinetics. Eur J Dermatol 1994; 4: 419-429

4. При курсовом лечении в течение 7-10 дней. Князева Н.В., Пернаков С.Н. Применение препарата Релиф® в послеоперационном периоде у родильниц с геморроем и заболеваниями аноректальной зоны. По материалам: Казимирко В.К. с соавт. Патология дистального отдела кишечника: механизмы развития, лечение. Киев, Морин, 2008. - с. 134-159

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



	Релиф®	Релиф® Адванс	Релиф® Ультра	Релиф® Про	Релифинин	РелиБаланс
Возраст	Взрослые и дети 12+			Взрослые 18+		
Дети	Дети до 12 лет: применять по указанию врача					
	До 4-х раз в день 7 – 14 дней	До 4-х раз в день. До 7 дней. При необходимости по рекомендации врача до 3-х недель.	До 4-х раз в день. До 7 дней	2 раза в день не более 2-х недель. При тяжелой форме заболевания первые 3 дня 3 раза в день. При стабильном улучшении достаточно применять 1 раз в сутки или через день.	2 раза в день с интервалом 12 часов. Не более 28 дней.	По 1 шаре во время еды. 1 раз в день.
Беременные и кормящие	Возможно по назначению врача, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка	Препарат применять после консультации с врачом	Противопоказан	Противопоказан в 1 триместре беременности Во 2 и 3 триместре и кормящим если потенциальная польза для матери превосходит потенциаль- ный риск для плода и младенца Избегать длительного назначения	Противопоказан	Противопоказан
QR-код на ИМП/ОХЛП/- Лист-вкладыш	<p>суппозитории</p>  <p>мазь</p> 	<p>суппозитории</p>  <p>мазь</p> 		<p>суппозитории</p>  <p>крем</p> 		

СН-20250117-14