

Сравнение жидких лекарственных форм АГП

	Дезлоратадин, раствор (Эриус®) ¹	Цетиризин, капли (Зодак®, Зиртек®) ^{2, 3}	Диметинден, водный раствор, капли (Фенистил®) ⁴
Врачебный контроль у детей до 1 года	Не требуется	Необходим	Прием только по назначению врача
Необходимость оценки факторов риска синдрома внезапной детской смерти	Отсутствует обязательное требование в ИМП	Требуется	Отсутствует обязательное требование в ИМП
Риск апноэ	Нет	Требуется оценка рисков возникновения апноэ	Требуется осторожность в связи с риском возникновения ночного апноэ
Частота сонливости	0,01%	1,8% (дети)	1–10%
Длительность применения	Строгие ограничения отсутствуют*	До 4 недель	До 7 дней**
Парабены в составе***	Нет	Да	Нет
Срок годности после вскрытия	До окончания срока годности, указанного на упаковке	3 месяца [#]	До окончания срока годности, указанного на упаковке

* Длительность терапии у пациентов до 3 лет определяется врачом.
** Без консультации врача.
*** Метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат — потенциально опасные консерванты, способные вызывать аллергические реакции.
Для препарата Зиртек®.

АГП — антигистаминные препараты.
ИМП — инструкция по медицинскому применению.

1. ИМП препарата Эриус® раствор П N014704/01 от 16.02.2024.
2. ОХЛП Зиртек® капли ЛП-№(010310)-(ПГ-RU) от 26.05.2025.
3. ОХЛП Зодак® капли ЛП-№(004304)-(ПГ-RU) от 16.01.2024.
4. ОХЛП Фенистил капли ЛП-№(004051)-(ПГ-RU) от 19.12.2023.